


CHAMPS & MILIEU AGRICOLE : MESURES DE LUTTE PRÉCONISÉES

PRÉVENTION




- Se protéger : vérifier sa sensibilité au pollen et utiliser masque et gants adaptés
- Respecter les rotations du tournesol avec blé / maïs, ou avec d'autres cultures (sorgho, pois, colza...)
- Eviter le retour tournesol / tournesol (délai de retour d'au moins 3 ans)
- Les parcelles fortement infestées sont à gérer plus particulièrement

TONTE



- Quand :
 - 1^{ère} coupe : en juillet avant la floraison
 - 2^{ème} coupe : fin août
- Comment :
 - Ambrosie majoritaire : coupe rase entre 2 et 6 cm
 - Graminées majoritaires : coupe plus haute vers 10 cm

BINAGE



- Quand :
 - Indispensable si l'herbicide est insuffisant
 - Tournesol : stade 2 feuilles
 - Maïs : stade 2 feuilles
- Comment : **bineuse classique** ou **type herse classique** (en conditions sèches)

DÉCHAUMAGE



- Quand : niveau d'**humidité du sol** adéquat
- Comment :
 - Travail superficiel du sol : outils à disques ou à dents
 - Travail profond du sol : charrue (sauf : sol limoneux battant)

FAUX SEMIS



- Quand : dès le mois de **mars**, avant l'implantation de la culture
 - Anticiper la préparation finale du sol (pré-semis éventuel) : herse ou vibroculteur
- Comment :
 - Ne pas retravailler le sol et désherber avec un herbicide non sélectif et non rémanent

DÉSHERBAGE



- voir au verso en fonction des cultures
- **herbicides homologués :**
e-phy.agriculture.gouv.fr

CHAMPS & MILIEU AGRICOLE : MESURES DE LUTTE PRÉCONISÉES

TOURNESOL



- Sélectivité difficile avec 2 plantes de la même famille botanique
- 2 possibilités en **post-semis pré-levée** :
 - aclonifen + flurtamone : à 4 litres par hectare
 - à 2.2 litres par hectare en pré-semis, après métolachlor à 2.2 litres par hectare
- **Conditions indispensables au semis** :
 - Humidité d'un mois d'avril
 - Incorporer un pré-semis à la dernière préparation du sol

CHAUMES



- Céréales d'hiver ou pois : **produit non rémanent**
 - Glyphosate
 - Sulfosate

POIS DE PRINTEMPS



- **Pré-levée** (80% d'efficacité maximale en fonction de l'humidité du sol) :
 - aclonifen + flurtamone
- **Post-levée** :
 - Intervention unique, après une impasse de pré-levée, ou ré-intervention après un traitement pré-levée insuffisamment efficace
 - bentazone ou pendiméthaline + imazamox

MAÏS & SORGHO



- Quand : avant ou après la levée des cultures et des adventices
- Stade 3 à 4 feuilles : effet parapluie en cas de population importante

JACHÈRES



- Quand : avant floraison de l'ambroisie
- Comment : désherbage chimique total autorisé à partir du 1^{er} juin

CÉRÉALES D'HIVER



- Jusqu'au stade 1-2 nœuds : hormones + matières actives de contact
- Jusqu'au gonflement : avec des sulfonyles