

PRINCIPES




- Supprimer les causes de son installation et de son développement :
 - Adapter le **couvert végétal** à l'usage (fréquentation : jeu ou passage...)
 - Nettoyer le **matériel** pouvant amener les graines
- Protéger le personnel :
 - S'assurer de sa non-sensibilité au pollen
 - Utiliser des masques adaptés et des gants

ARRACHAGE



- Quand : en fin de croissance végétative, c'est à dire **avant la floraison** (juillet)
- Comment : enlever la plante avec ses racines, **sans la casser**

TONTE



- Quand :
 - **1^{ère} coupe : en juillet avant la floraison**
 - **2^{ème} coupe : fin août**
- Comment :
 - ambrosie majoritaire : coupe rase entre 2 et 6 cm
 - graminées majoritaires : coupe plus haute vers 10 cm

DESHERBAGE



- Quand : efficacité maximale au **stade plantule 3 à 4 feuilles**
 - **herbicides sélectifs conservant les graminées**
- Comment :
 - désherbant total de contact sous hygrométrie élevée ou désherbant systémique sur végétation sèche (sans rosée)

PAILLAGE



- Quand : remplacer la **matière organique** tous les 2 ans
- Comment : **couvrir le sol pour bloquer la végétation** (*paille, tourbe, feuilles, écorces, copeaux de bois, foin, gravier, pierre concassée, textiles, carton...*)

VÉGÉTALISATION



- Quand : au **printemps**, c'est à dire avant la levée des plantules d'ambrosie
- Comment : **espèces couvrantes** adaptées (*arbustives et herbacées : ray-grass anglais, trèfles blanc & rouge, lotier, fétuque rouge demi-traçante, fétuque élevée, pâturin des prés...*)
- **Risque maximum** : sol nu entre les jeunes plantations arborées et arbustives, et les semis à couverture lente (idéal : semis couvrant d'automne et/ou paillage)